



گیاهان دارویی (بخش پنجم)

Medicinal Plants (Part 5)



دکتر مجید غیور مبرهن
متخصص تغذیه از انگلستان

◀ تداخلات دارویی با گیاه ولیک (کیالک) ▶

◀ گلیکوزیدهای قلبی مانند دیگوکسین: از آنجا که گیاه ولیک دارای اثرات مشابه گلیکوزیدهای قلبی مانند داروی دیگوکسین می باشد، مصرف توأم آن با داروی دیگوکسین می تواند سبب افزایش ناخواسته قدرت انقباضی قلب و بروز عوارض ناشی از آن شود.

◀ گیاهان کاهنده فشار خون مانند سیر: یکی از کاربردهای گیاه ولیک در طب سنتی درمان فشار خون بالا می باشد، زیرا این گیاه سبب اتساع عروق و کاهش فشار خون می شود. از این رو مصرف گیاه ولیک به همراه سایر گیاهان کاهنده فشار خون مثل سیر، تحت نظر پزشک، به پایین آمدن فشار خون کمک می کند.

◀ گونه های مختلف گل انگشتانه ▶

◀ مهم ترین موارد کاربرد ▶

◀ درمان نارسایی قلبی

◀ تداخلات دارویی با گل انگشتانه ▶

◀ دیگوکسین: گیاهان حاوی گلیکوزیدهای قلبی مانند گونه های گل انگشتانه سبب افزایش ناخواسته اثر بخشی داروی دیگوکسین در افزایش قدرت انقباضی قلب و سمیت دیگوکسین می شوند.



◀ وارفارین: فلفل قرمز دارای خاصیت مهار تجمع پلاکتی می باشد، از این رو مصرف آن به همراه داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین و سایر داروهای مشابه سبب افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد این داروها می شود.

◀ داروهای مهار کننده آنزیم مبدل (ACEIs):

فلفل قرمز دارای خواص تعديل کننده فشار خون می باشد و در طب سنتی جهت درمان فشار خون بالا کاربرد دارد. اگرچه مصرف فلفل قرمز می تواند به کاهش فشارخون کمک کند اما مصرف توأم آن با داروهای مهار کننده آنزیم مبدل (ACEIs) سبب کاهش اثربخشی این دارو ها در پایین آوردن فشار خون می شود.

◀ ولیک (کیالک) ▶

◀ مهم ترین موارد کاربرد ▶

◀ درمان فشار خون بالا

◀ نارسایی و ضعف عضله قلب

◀ آنژین صدری



Medicinal Plants



◀ فلفل قرمز ▶

◀ مهم ترین موارد کاربرد ▶

- ◀ ضعف و ناتوانی جسمی در سنین بالا به خصوص موارد ناشی از عدم گردش خون مناسب

◀ دردهای عصبی و گلودرد

(که به صورت قرقره استفاده می‌شود)

◀ تداخلات دارویی با فلفل قرمز ▶

- ◀ آسپرین: یکی از عوارض شایع مصرف طولانی مدت آسپرین، آسیب مخاط معده و خونریزی می‌باشد که در بسیاری از افراد منجر به قطع دارو می‌گردد. ترکیب کاپسائیسین که ماده موثره اصلی موجود در فلفل قرمز می‌باشد از طریق اثر بر نورون‌های عصبی موجود در جدار معده سبب کاهش بروز آسیب‌های مخاطی و زخم معده ناشی از مصرف آسپرین می‌شود.

Medicinal Plants



- ◀ داروهای ضد انعقاد خون و رقیق کننده خون: سیر موجب افزایش زمان انعقاد خون می‌شود و به این ترتیب احتمال عارضه خونریزی ناشی از داروهای ضد انعقاد (مانند وارفارین) و ضد پلاکت (مانند تیکلوبیدین) را افزایش می‌دهد.

◀ سیر ▶

◀ مهم ترین موارد کاربرد ▶

- ◀ موارد خفیف تا متوسط فشارخون بالا

◀ چربی خون بالا

◀ عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی

◀ تداخلات دارویی با گیاه سیر ▶

- ◀ گیاه ژینکو: گیاه ژینکو امروزه به طور گستردگی جهت تقویت حافظه و پیشگیری از بروز آلزایمر به کار می‌رود. با توجه به اینکه این گیاه دارای اثرات مهاری بر روی فاکتور فعل کننده پلاکتی می‌باشد، مصرف توامان با سیر می‌تواند سبب افزایش احتمال خونریزی و زمان انعقاد خون شود.